





```
Cayam
DESIGNATION
CLOS EPLANCHE 19 RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 2
PORT : érig - trig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 2.7.69
Pourriture : 2
GRAPPE : G - N - P : L - M - C BAIE : TG - G 19 M - P
        disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb
              CHARGE :
s 2 2 avec pépins - apyrène
                      - coloré
```

```
Cayoun
DESIGNATION
CLOS I PLANCHE 19 RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 4,5
PORT : érig - érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5-8-70.
Date de Maturité : 7.9.70 X
Pourriture : 2
GRAPPE : G - M -(P) L - M -(C
BAIE : TG - G - M - P 17 x17
       disc. - sph. - ell. - av. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (5) m - ar - fox - herb
              CHARGE :
       avec pépins - apyrène
       JUS : inc. - coloré
s *
```

```
Cayam
DESIGNATION
CLOST PLANCHE 19 RANG S Souche 7
Vigueur : &
PORT : érig - 2 érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5.8.71
Date de Maturité : 30,8 H
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) - P/6×48
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (8) - n - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
s2 3
      avec pépins - apyrène
s3 o
      JUS : inc - coloré
84 0
```

Année 1959

Eayam.

| | Nembre ! DATES | | | | | | | | |
|------|----------------|-----|------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|
| | I Total | 1/3 | 11-3 | 1 | 1 | ř : | | | ! 1 |
| · vi | ! | | 1 | 1 | 1 | | | | ţ Ţ |
| 2 | 1 9 6 | l | | 7 8 8 | 1 0 0 | 1 , , 1 | a 9 | 7 0 | 1 0 0 |
| 3 | 1 34 . | i | 12. | 1 | 1 6 0 | | پ م | | ! |
| A | | | 1 | 1 0 0 | | 1 2 0 | 7 0 | | 1 |
| 5 | | 1 | 1 | 1 0 0 | 1 | 1 . , 1 | s . | 3 4 | 1 - 0 |
| | 1 | Į. | 1 | 1 | I | 1 | | | Ī |

De 11-3-59 x

Année : 1960

Nº . Cayom? . . Planche . 7 5 108 13. Côté . . .

| | ! Nombre! ! tctal ! | | | DATES | | | | ! | | |
|----------------------------------|---------------------|-----|--------|-------|--------|-------|----|---|----------|---|
| | !!!! | 8/3 | ! | !! | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! |
| X | 1 | | 1 | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| × | 1 ! | | ! | ! | 1 | 1 | 1 | | ! | |
| 3 | ! 2, ! | 2. | 1 * | ; | 1 | 1 | 1 | | <u>.</u> | |
| 1 | 1 1 | 2 | ! ! | ! | ! | ! | 1 | : | 1 | |
| A. | !!!! | | ! | 1 | 1 | 1 | Į. | 1 | ! | |
| ** | !!!! | | 1 | ! | 067.3. | 160 x | 1 | | ! | |
| TOTAL STATE LANGE SLAG SANGE THE | !!! | | 1 | ! | 1 | 1 | 1 | ! | ! | |

Année: 1964 Cayam (Layam)
Emplacement: 7 5 1084.3

| !!!Nombre!!total! | 27/2/ | DATES | ! |
|---------------------------------------|-------|-------------|---|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 1 4 | De 27-2-61x | |

| ! Hombr ! !total | i | | DAT : S | | |
|------------------------|--------|------------|---------|---|--|
| ! | 1 1 | | 1 1 1 | incidentina, naki naki na | |
| 1 8: | 1 1 1 | ! | 1 ! ! | ! | |
| 2 ! 6 | 1 3 10 | i | i i i | | |
| 3 81 | 1 1 | ! | | ! | |
| 4 + ! | 1 1 | | 1 1 1 | 1 | |
| 5 7! | 1 1 | | 1 1 1 | | |
| 6 ! | 1 1 | ! <u> </u> | De 11- | 3 6 0 | |
| 7 ! | i | i | Pilli | i | |
| 9 ! | | | 1 1 1 | ! | |
| 9 1 | | | 1 1 1 | | |
| 10 | 1 | | | 1 | |

| | C | eyam | | |
|---|--------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| Festilité taille lon | 2. 72 0 | 99 | | |
| Fertilité taille long R32 Est, s 41-45 | me 82 84 | 00 | | |
| IN OU EST S 41- HS | 16 16 | 5 | | |
| | | 1-1-1- | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 4-1-1-1-1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cayam

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté S Nº 108 Souche # #3 Mrs.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 12.5.58

Nº ordre

Payam

Désignation:

VASSAL Planche 7 côté S Nº 108 souche # 12 3 4 4.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 1-f entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-logiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Truel 12-5.58

Désignation: Cayam

Emplacement: I 13 57 A. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O jaune 2 - rouge clair Di le bue rouge foncé, 4.

52 - bourgeon : coloré (vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Cayam

Désignation :

Emplacement: I 19,57

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation Cayam I. 19 57

Clos Planche Côté Frang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne 2 + grande 3

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 + duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle péticle/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2
 supérieur à 90° 3.

Emplacement: I 1957

Désignation: Cayam

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenno 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 60
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédonculo horbacó 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la promière ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 2 très potito 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc ()- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 2 irrégulière 2.
- 28 Forme: discordo O sphérorde () ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2).
- 29 A section transversalo : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse (5)
- 33 A pulpo charnuo 6 jutcuso 7 molle (8)
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 42 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1) pou apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6
- 32 A pinceau : coloré non coloré
- 33 De séparation facile (égronouse) 1 difficile (2)

Dénomination ... Caylam Planche . X. 19.5.7..... Coté Rang souche 1 23-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). Sarment : ramifié (1), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversals: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à reils massifs (4),
 séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).

i entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

```
No d'ordre: . . . . . Désignation ; layan! . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2)-(3)
10 - L<sub>2</sub>/L<sub>0</sub> / , , , . . . , , . (1) - (2).
12 - S, lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S, lat. inf. (prof.). , . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) , . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : (1-(2)-3.
           Direction
           Forme : 4 .. 5.
           Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                     Germes 58.
```

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Var 3,006

Année: 2007

Code introduction:

Code cépage: 0Mtp193 Nom introduction: Cavam

Emplacement: Vass2R12s036-040

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 6 | 8/3 | 202013 | 0 | |
| 2 | 4 | 8/3 | 12/3 | 0 | |
| 3 | 9 | 7 3 | 12 3 | 1 | |
| 4 | do | 8/3 | 16 3 | 7 | |
| 5 | 7 | 8 3 | 201013 | O marpé. | |
| Moyenne | 36 | | 1413 | 8 | 2 |

| 15/5 | 20/5 | | 17/07 | 26/07 | 20/8 | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---|---|
| | +1 | | | 1. 0 | | |
| I.N.R.A. – Doma | aine de Vassal | - version 2003 | H/7- quelques Bain | +2 es Tenches & M proche DV | 13/8-enion le 12/7 20/8- garge The 1 | A DR 13. d'esu. peu S. J. 17 juil At Prien mires |

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Vas 3106

Année:2008 grappgen07

Observateur:

CodeIntro: 0Mtp193

NomVar: Cépage non identifié

Nom introduction: Cayam

Emplacement: Vass2R12s036-040

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal: Taille Hus langue

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 9 | M/3 (3dib) | 16 3 | 8 | |
| 2 | 9 | 3/3 3/10/2 | 16/3 | 8 | |
| 3 | 7 | 3/3 3466811/3 | 15/3 | 8 | |
| 4 | 6 | | 11/3 | 7 | |
| 5 | 4 | | 17/3 | 5 | |
| Moyenne | 35 | | 15/3 | 36 | 10 |

| | ate de lébut | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 19/5 | 28/5 | | 24/04 | 31/02 | 10/09 | |

scocked Fle. 5/5/01 +4 (35) 23/5 pas encountificais proche

X +1 IR: M CITHOL

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2007

Observateur: TD

Code cépage

Code introduction: 0Mtp193

Nom introduction: Cayam

Emplacement: Vass2R12s036-040

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte (1)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7) - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204).

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 1- très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée:.....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8 (stade floraison)

Année: 2007 GrappGenne2006

Observateur: TD

Code cépage Code introduction : 0Mtp193

Nom introduction: Cayam Emplacement: Vass2R12s036-040

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 010 couleur face ventrale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible D- moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence Îl - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible ? - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence: jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base: absence 1 - présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune 32

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8 (entre stades nouaison et véraison)

Année: 2007 GrappGene06 Observateur:

Code cépage: Code introduction: 0Mtp193

Nom introduction: Cayam Emplacement: Vass2R12s036-040

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne/5)- grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 72- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rougé 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1)- présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3/- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1/2 présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Autre

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui] [sinus latéraux : ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non]

[dents: forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3(5)7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 5/8 (stade maturité) Année: 200 8 Observateur: Code cépage : Code introduction: 0Mtp193 Nom introduction: Cayam Emplacement: Vass2R12s036-040 Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 Valeur absolue (en cm.): longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 3-Valeur absolue (en cm.): 10 cm large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 92 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidal 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent D - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 17 mm oiv 222 uniformité de la grosseur pon uniforme 1 - uniforme (3) oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent D- apparent 2. oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 - coloré 1.
000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée 2.
Millerandage : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyen 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) - présentes 2.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2007

GrappGen06

Observateur: TD

Code cépage:

Code introduction: 0Mtp193

Nom introduction: Cayam

Emplacement: Vass2R12s036-040

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1/2- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 🗇 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 30 ~

Valeur absolue: 8

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence ①— partiellement présente 2 — présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »